



Sygeplejefaglig retningslinje Hjemmeplejen og Plejehjem

Oramorph – Røde dråber

Udarbejdet af
palliationssygeplejerske Ulla
Jørgensen og
medicin/kompetencegruppen
Godkendt af chef for
Sygepleje og Kvalitet Anette
Bach Mogensen
Version 1.0

Gældende fra 05.10.23
Rev. senest okt 26

Baggrund

Oramorph er et morfinpræparat, der administreres i dråber, som indtages gennem munden. Det bruges ved smertebehandling og ved alvorlige vejrtrækningsproblemer. I lave doser har Oramorph en respirationssvækkende virkning, der kan bruges som lindrende behandling ved akut lufthunger eller som forebyggende inden mobilitet ved fx KOL-patienter.

Præparatet bør anvendes umiddelbart efter dispensering, da det ikke tåler dagslys. Derudover kan der være risiko for kontaminering af præparatet ligesom det er uvist, om der kan være interaktioner ml. emballage og præparat.

Undtagelser herfor og hvor patientsikkerheden kan sikres, har Fredericia Kommune besluttet, at der kan optrækkes til flere administrationstider ved fx dårlige KOL-patienter og terminale borgere til udlevering til selvadministration eller til medicinadministration, da Oramorph ofte bruges i akutte situationer. Denne fremgangsmåde er i tråd med Det Palliative Teams anvendelse af præparatet.

Præparatet ordineres altid af en læge.

Formål

- Sikre korrekt håndtering af præparatet for at bevare kvalitet og patientsikkerhed

Krav til personalet

Sygeplejerske og SSA må dispensere dråberne.

SSH må administrere de ophældte dråber som en personlig kompetence

Principper

Afviges der fra Lægemiddelstyrelsens anbefalinger om at bruge præparatet lige efter dispensering, skal der i handlingsanvisningen fremgå klare aftaler:

- Hvorfor der er behov for at trække op i sprøjter/bæger til flere administrationstidspunkter
- Hvordan det sikres at ubrugt medicin kasseres efter 24 timer
- Hvordan den optrukne medicin skal opbevares

1 ml = 16 dråber

1 dråbe indeholder 1,25 mg morfinsulfat

4 dråber indeholder 5 mg morfinsulfat



Sygeplejefaglig retningslinje Hjemmeplejen og Plejehjem

Oramorph – Røde dråber

Udarbejdet af
palliationssygeplejerske Ulla
Jørgensen og
medicin/kompetencegruppen
Godkendt af chef for
Sygepleje og Kvalitet Anette
Bach Mogensen
Version 1.0

Gældende fra 05.10.23
Rev. senest okt 26

Fremgangsmåde

- Håndhygiejne inden medicinbehandling
- For at dispensere dråberne skal du åbne flasken og vende den på hovedet. Herved frigives de første dråber
- Hvis de første dråber ikke kan komme ud af flasken, bank da på bunden af flasken med en finger, uden at ryste flasken, for at bryde luftboblerne i flaskens hals
- Hvis dråbetælleren sidder fast, rejs flasken op og luk den med hættten. Slå forsigtigt flasken mod et bord for at bryde luftboblerne i flaskens hals. Åben herefter flasken og vend den på hovedet. De første dråber vil blive frigivet
- Den ordinerede dosis trækkes op i en sprøjte som lukkes med en prop eller i et medicinbæger med låg
- Hver sprøjte/bæger skal påsættes en label med oplysning om :
 - Navn og CPR-nummer
 - Navn på præparat og styrke
 - Angivelse af dråber
 - Dato og tidspunkt for optrækning
- De forfyldte sprøjter/bægre skal opbevares mørkt og kan fx pakkes i stanniol, i en mørk kuvert, en skål med låg e.l.
- Forfyldte sprøjter, der ikke er opbrugt kasseres efter 24 timer i gul kanyleboks og medtages til destruktion via MOTAS.

Anvendelse

- Dråberne doseres på en teske, i et medicinbæger eller på et stykke sukker
- Dråberne kan evt. fortyndes med få dråber vand
- Dråberne kan også tages direkte fra engangssprøjten
- Dråberne gives oralt og "lægges på" slimhinden i munden/under tungen og holdes lidt i munden, før de synkes – vent gerne nogle minutter med at skylle munden efterfølgende.

Litteraturhenvisning/referencer

- Lægemiddelstyrelsen 15. sep 2021, Produktresumé for Oramorph orale dråber, opløsning:
<https://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7402>
- Det Palliative Team, dokumentID: 493787
<https://inonet.regionsyddanmark.dk/D4Doc/Book/RSDdokument.asp?DokID=493787>